

CAPITOLO IV

Il campione Infermieri: analisi qualitativa e quantitativa dei dati rilevati

Il presente capitolo è dedicato all'analisi dei risultati relativi al gruppo degli infermieri, composto da 33 elementi.

Le domande che precedono le voci del questionario hanno reso le seguenti informazioni.

Il campione degli utenti è costituito dal 63,6% di donne e dal 36,4% di uomini (Tabella nr. 1).

Sesso	Frequency	Percent	Cum Percent
F	21	63,6%	63,6%
M	12	36,4%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 1 Campione infermieri: frequenza del sesso




Grafico nr. 1 Campione infermieri: sesso

L'età delle persone intervistate (Tabella nr. 2) è compresa tra 28 anni, il più giovane, e 55, il più anziano. L'età con la frequenza maggiore è 43 anni con cinque casi, pari al 15,2% del campione; seguono 30, 32, 40, 42 anni con tre casi per ciascuna età, pari al 9,1% ; 28, 35, 45 anni con due casi per ciascuna età, pari al 6,1% ed infine le età rimanenti con un solo caso ciascuna pari al 3% del campione.

Età	Frequency	Percent	Cum Percent
28	2	6,1%	6,1%
30	3	9,1%	15,2%
31	1	3,0%	18,2%
32	3	9,1%	27,3%
35	2	6,1%	33,3%
40	3	9,1%	42,4%
41	1	3,0%	45,5%

42	3	9,1%	54,5%
43	5	15,2%	69,7%
44	1	3,0%	72,7%
45	2	6,1%	78,8%
46	1	3,0%	81,8%
47	3	9,1%	90,9%
52	1	3,0%	93,9%
54	1	3,0%	97,0%
55	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 2 Campione infermieri: frequenza età

Età degli infermieri




Grafico nr. 2 Campione infermieri: età

L'età lavorativa degli infermieri intervistati è compresa tra 3 e 36 anni di servizio ed è illustrata di seguito (Tabella nr. 3), con le relative percentuali.

Età lavorativa	Frequency	Percent	Cum Percent
3	2	6,1%	6,1%
4	2	6,1%	12,1%
5	3	9,1%	21,2%
6	1	3,0%	24,2%
9	1	3,0%	27,3%
10	1	3,0%	30,3%
11	1	3,0%	33,3%
12	1	3,0%	36,4%
14	1	3,0%	39,4%
15	2	6,1%	45,5%
17	3	9,1%	54,5%
18	1	3,0%	57,6%
19	1	3,0%	60,6%
20	3	9,1%	69,7%
22	2	6,1%	75,8%
23	1	3,0%	78,8%
24	1	3,0%	81,8%
25	2	6,1%	87,9%
26	1	3,0%	90,9%
29	1	3,0%	93,9%
32	1	3,0%	97,0%
36	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 3 Campione infermieri: frequenza età lavorativa

Età lavorativa degli infermieri




Grafico nr. 3 Campione infermieri: età lavorativa

L'età lavorativa presso Rianimazione ed U.T.I.C. è compresa tra 2 e 23 anni di servizio, ed è illustrata di seguito (Tabella nr. 4), con le relative percentuali.

Età lavorativa c/o rianimazione/U.T.I.C.	Frequency	Percent	Cum Percent
2	2	6,1%	6,1%
3	4	12,1%	18,2%
4	3	9,1%	27,3%
5	3	9,1%	36,4%
6	1	3,0%	39,4%
7	3	9,1%	48,5%
8	1	3,0%	51,5%
10	5	15,2%	66,7%

11	3	9,1%	75,8%
12	1	3,0%	78,8%
15	1	3,0%	81,8%
17	2	6,1%	87,9%
20	2	6,1%	93,9%
23	2	6,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 4 Campione infermieri: frequenza età lavorativa in Terapia Intensiva

Età lavorativa presso Unità di Terapia Intensiva




Grafico nr. 4 Campione infermieri: età lavorativa in Terapia Intensiva

Il 54,5% del campione, pari a 18 infermieri, ha conseguito il Diploma regionale; il 27,3%, pari a 9 infermieri, la Laurea di I° livello; il restante 18,2%, pari a 6 infermieri, il Diploma universitario (Tabella nr. 5).

Titolo di studio	Frequency	Percent	Cum Percent
Diploma regionale	18	54,5%	54,5%
Diploma universitario	6	18,2%	72,7%
Laurea I° livello	9	27,3%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 5 Campione infermieri: frequenza titolo di studio




Grafico nr. 5 Campione infermieri: titolo di studio

Analizziamo ora i risultati di ciascuna voce del questionario, in ordine di numerazione di domanda, come da questionario.

1. Avere letto o cuscino scomodi:

29 infermieri, pari all'87,9% del campione, non lo hanno indicato tra le 5 voci più importanti;

2 infermieri, pari al 6,1% del campione, hanno assegnato un punteggio di 5;

1 infermiere, pari al 3% del campione, ha assegnato un punteggio di 2;

il restante 3% del campione, 1 infermiere, lo ha invece indicato come il disagio in assoluto maggiormente avvertito, assegnando un punteggio di 1.

1) Avere letto e cuscino scomodi	Frequency	Percent	Cum Percent
0	29	87,9%	87,9%
1	1	3,0%	90,9%
2	1	3,0%	93,9%
5	2	6,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 6 Campione infermieri: frequenza voce 1)

2. Essere sottoposto a frequenti misurazioni dei parametri vitali e/o ad esami emato-fisici:

28 infermieri, pari al 84,8% del campione, non lo hanno indicato tra le 5 voci ritenute più importanti;

3 infermieri, pari al 9,1%, hanno assegnato un punteggio di 1, ritenendo il disagio espresso dalla voce come quello maggiormente avvertito;

1 infermiere, pari al 3%, ha assegnato un punteggio di 2;

1 infermiere, pari al 3%, ha assegnato un punteggio di 5.

2) Essere sottoposto a frequenti misurazioni dei parametri vitali e/o ad esami emato-fisici	Frequency	Percent	Cum Percent
0	28	84,8%	84,8%
1	3	9,1%	93,9%
2	1	3,0%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 7 Campione infermieri: frequenza voce 2)

3. Percepire che l'infermiere è preoccupato per lo stato di salute della persona:

30 infermieri, pari al 90,9% del campione, non lo hanno indicato tra le 5 voci ritenute più importanti;

1 infermiere, pari al 3%, ha assegnato un punteggio di 2;

1 infermiere, pari al 3%, ha assegnato un punteggio di 5;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, lo ha invece ritenuto il disagio maggiore in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

3) Percepire che l'infermiere è preoccupato per lo stato di salute della persona	Frequency	Percent	Cum Percent
0	30	90,9%	90,9%
1	1	3,0%	93,9%
2	1	3,0%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 8 Campione infermieri: frequenza voce 3)

4. Avere preoccupazioni relative alla sfera affettiva/sexuale:

33 infermieri, pari al 100% del campione, non lo hanno classificato tra le 5 voci più importanti.

4) Avere preoccupazioni relative alla sfera affettiva/sexuale	Frequency	Percent	Cum Percent
0	33	100,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 9 Campione infermieri: frequenza voce 4)

5. Trovarsi in un ambiente troppo caldo o troppo freddo:

30 infermieri, pari al 90,9% del campione, non considerano questa voce come tra le 5 più importanti;

1 infermiere, 3%, assegna un punteggio di 2;

1 infermiere, 3%, assegna un punteggio di 3;

il restante 3%, 1 infermiere, assegna invece il punteggio maggiore 1.

5) Trovarsi in un ambiente troppo caldo o troppo freddo	Frequency	Percent	Cum Percent
0	30	90,9%	90,9%
1	1	3,0%	93,9%
2	1	3,0%	97,0%
3	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 10 Campione infermieri: frequenza voce 5)

6. Essere nudi e non avere privacy:

il 42,4% del campione, pari a 14 infermieri, non ritiene questa voce prioritaria;
il 21,2% del campione, pari a 7 infermieri, assegna un punteggio di 2;
il 15,2% del campione, pari a 5 infermieri, considera l'essere nudi e l'assenza di privacy il disagio maggiore in assoluto, assegnando un punteggio di 1;
il 12,1% del campione, pari a 4 infermieri, assegna un punteggio di 4;
il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 3;
il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5.

6) Esseri nudi e non avere	Frequen	Percen	Cum
0	14	42,4%	42,4%
1	5	15,2%	57,6%
2	7	21,2%	78,8%
3	2	6,1%	84,8%
4	4	12,1%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 11 Campione infermieri: frequenza voce 6)

7. Avvertire la presenza di persone che parlano intorno al letto:

il 93,9% del campione, pari a 31 infermieri, non considera questa voce come appartenente alle 5 più importanti;
la restante percentuale, 6,1%, le assegna un punteggio di 2.

7) Avvertire la presenza di persone che parlano intorno al letto	Frequency	Percent	Cum Percent
0	31	93,9%	93,9%
5	2	6,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 12 Campione infermieri: frequenza voce 7)

8. Non essere certi di aver compreso le spiegazioni circa il proprio stato di salute ed i trattamenti ricevuti ed avere strani “macchinari” intorno:

il 69,7% del campione, pari a 23 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, la considera come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 2;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5.

8) Non essere certi di aver ben compreso le spiegazioni circa il proprio stato di salute ed i trattamenti ricevuti ed avere strani "macchinari" intorno	Frequency	Percent	Cum Percent
0	23	69,7%	69,7%
1	3	9,1%	78,8%
2	3	9,1%	87,9%
3	3	9,1%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 13 Campione infermieri: frequenza voce 8)

9. Sentire la mancanza dei propri familiari:

il 72,7% del campione, pari a 24 infermieri, esclude la voce dalle 5 più importanti;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, la considera come la voce principale, assegnando un punteggio di 1;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 4;

il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il restante 3%, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5.

9) Sentire la mancanza dei propri familiari	Frequency	Percent	Cum Percent
0	24	72,7%	72,7%
1	3	9,1%	81,8%
3	2	6,1%	87,9%
4	3	9,1%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 14 Campione infermieri: frequenza voce 9)

10. Sentire dolore:

il 51,5% del campione, pari a 17 infermieri, non ritiene questa voce appartenente alle 5 principali;

il 18,2% del campione, pari a 6 infermieri, considera il dolore il disagio maggiore, attribuendo un punteggio di 1;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 5;
il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 2;
il restante 6,7% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 4.

10) Sentire dolore	Frequency	Percent	Cum Percent
0	17	51,5%	51,5%
1	6	18,2%	69,7%
2	2	6,1%	75,8%
3	3	9,1%	84,8%
4	2	6,1%	90,9%
5	3	9,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 15 Campione infermieri: frequenza voce 10)

11. Percepire la costante presenza di infermieri che svolgono attività intorno al proprio letto:

il 90,9% del campione, pari a 30 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;
il restante 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 4.

11) Percepire la costante presenza di infermieri che svolgono attività intorno al proprio letto	Frequency	Percent	Cum Percent
0	30	90,9%	90,9%
4	3	9,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 16 Campione infermieri: frequenza voce 11)

12. Percepire la presenza di troppa luce anche di notte e non riuscire a dormire:

il 78,8% del campione, pari a 26 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 4;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna il punteggio di 1, ritenendo questa voce come quella prioritaria in assoluto.

12) Percepire la presenza di troppa luce anche di notte e non riuscire a dormire	Frequency	Percent	Cum Percent
0	26	78,8%	78,8%
1	1	3,0%	81,8%
3	3	9,1%	90,9%
4	2	6,1%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 17 Campione infermieri: frequenza voce 12)

13. Avvertire cattivi odori intorno:

il 93,9% del campione, pari a 31 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 2;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 4.

13) Avvertire cattivi odori intorno	Frequency	Percent	Cum Percent
0	31	93,9%	93,9%
2	1	3,0%	97,0%
4	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 18 Campione infermieri: frequenza voce 13)

14. Avere paura del futuro e/o paura di morire:

il 39,4% del campione, pari a 13 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 18,2% del campione, pari a 6 infermieri, assegna un punteggio di 5;

il 15,2% del campione, pari a 5 infermieri, assegna un punteggio di 4;

il 12,1% del campione, pari a 4 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, reputa la voce come prioritaria;

il restante 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 2.

14) Avere paura del futuro e/o paura di morire	Frequency	Percent	Cum Percent
0	13	39,4%	39,4%
1	3	9,1%	48,5%
2	2	6,1%	54,5%
3	4	12,1%	66,7%
4	5	15,2%	81,8%
5	6	18,2%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 19 Campione infermieri: frequenza voce 14)

15. Avere sete:

il 60,6% del campione, pari a 20 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 12,1% del campione, pari a 4 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il 12,1% del campione, pari a 4 infermieri, assegna un punteggio di 5;

il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, reputa la voce come prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1;

il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 4;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 2.

15) Avere sete	Frequency	Percent	Cum Percent
0	20	60,6%	60,6%
1	2	6,1%	66,7%
2	1	3,0%	69,7%
3	4	12,1%	81,8%
4	2	6,1%	87,9%
5	4	12,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 20 Campione infermieri: frequenza voce 15)

16. Avere tubi nel naso e/o nella bocca e non essere in grado di comunicare:

il 57,6% del campione, pari a 19 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 15,2% del campione, pari a 5 infermieri, reputa la voce come prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 4;
il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 5;
il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 2;
il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 3.

16) Avere tubi nel naso e/o nella bocca e non essere in grado di comunicare	Frequency	Percent	Cum Percent
0	19	57,6%	57,6%
1	5	15,2%	72,7%
2	2	6,1%	78,8%
3	1	3,0%	81,8%
4	3	9,1%	90,9%
5	3	9,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 21 Campione infermieri: frequenza voce 16)

17. Sentire altri pazienti che si lamentano:

il 90,9% del campione, pari a 30 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;
il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 5;
il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, reputa la voce come prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

17) Sentire altri pazienti che si lamentano	Frequency	Percent	Cum Percent
0	30	90,9%	90,9%
1	1	3,0%	93,9%
5	2	6,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 22 Campione infermieri: frequenza voce 17)

18. Non conoscere la durata della propria degenza in Terapia Intensiva:

l' 84,8% del campione, pari a 28 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 2;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 3;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5.

18) Non conoscere la durata della propria degenza in Terapia Intensiva	Frequency	Percent	Cum Percent
0	28	84,8%	84,8%
2	3	9,1%	93,9%
3	1	3,0%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 23 Campione infermieri: frequenza voce 18)

19. Avere paura dell'incontinenza e di sporcare il letto:

l' 87,9% del campione, pari a 29 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 3;

il restante 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, considera questa voce come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

19) Avere paura dell'incontinenza e di sporcare il letto	Frequency	Percent	Cum Percent
0	29	87,9%	87,9%
1	2	6,1%	93,9%
3	2	6,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 24 Campione infermieri: frequenza voce 19)

20. Avvertire disagio durante le pratiche igieniche perché l'acqua è troppo fredda/calda:

il 90,9% del campione, pari a 30 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 2;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 3;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5.

20) Avvertire disagio durante le pratiche igieniche perché l'acqua è troppo fredda/calda	Frequency	Percent	Cum Percent
0	30	90,9%	90,9%
2	1	3,0%	93,9%
3	1	3,0%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 25 Campione infermieri: frequenza voce 20)

21. Non sapere dove si è, che giorno è, che ore sono e/o essere annoiato:

il 90,9% del campione, pari a 30 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 3;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 4;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, considera questa voce come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

21) Non sapere dove si è, che giorno è, che ore sono e/o essere annoiato	Frequency	Percent	Cum Percent
0	30	90,9%	90,9%
1	1	3,0%	93,9%
3	1	3,0%	97,0%
4	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 26 Campione infermieri: frequenza voce 21)

22. *Avere fame:*

l' 84,8% del campione, pari a 28 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 2;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 3;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 4;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 5.

22) Avere fame	Frequency	Percent	Cum Percent
0	28	84,8%	84,8%
2	2	6,1%	90,9%
3	1	3,0%	93,9%
4	1	3,0%	97,0%
5	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 27 Campione infermieri: frequenza voce 22)

23. *Essere svegliati durante il sonno notturno da allarmi vari e telefono che squilla:*

l' 87,9% del campione, pari a 29 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 2;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 3;

il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 4;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, considera questa voce come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

23) Essere svegliati durante il sonno notturno da allarmi vari e telefono che squilla	Frequency	Percent	Cum Percent
0	29	87,9%	87,9%
1	1	3,0%	90,9%
2	1	3,0%	93,9%
3	1	3,0%	97,0%
4	1	3,0%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 28 Campione infermieri: frequenza voce 23)

24. Non poter ricoprire il ruolo abituale nella famiglia e/o avere preoccupazioni lavorative e/o finanziarie:

il 93,9% del campione, pari a 31 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il restante 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, assegna un punteggio di 4.

24) Non poter ricoprire il ruolo abituale nella famiglia e/o avere preoccupazioni lavorative e/o finanziarie	Frequency	Percent	Cum Percent
0	31	93,9%	93,9%
4	2	6,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 29 Campione infermieri: frequenza voce 24)

25. Avere la sensazione di soffocare:

il 78,8% del campione, pari a 26 infermieri, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, considera questa voce come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1;

il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, assegna un punteggio di 5;

il restante 3% del campione, pari ad 1 infermiere, assegna un punteggio di 4.

25) Avere la sensazione di soffocare	Frequency	Percent	Cum Percent
0	26	78,8%	78,8%
1	3	9,1%	87,9%
4	1	3,0%	90,9%
5	3	9,1%	100,0%
Total	33	100,0%	100,0%

Tabella nr. 30 Campione infermieri: frequenza voce 25)

Sintetizzo di seguito i risultati ottenuti dall'indagine da me condotta per la parte relativa al campione infermieri.

Il 18,2% del campione, pari a 6 infermieri, ha indicato “*sentire dolore*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 6 Campione Infermieri: punteggio voce 10)

Il 15,2% del campione, pari a 5 infermieri, ha indicato “*essere nudi e non avere privacy*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 7 Campione Infermieri: punteggio voce 6)

Il 15,2% del campione, pari a 5 infermieri, ha indicato “*avere tubi nel naso e/o nella bocca e non essere in grado di comunicare*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 8 Campione Infermieri: punteggio voce 16)

Il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, ha indicato “*essere sottoposto a frequenti misurazioni dei parametri vitali e/o ad esami emato-fisici*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 9 Campione Infermieri: punteggio voce 2)

Il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, ha indicato *“non essere certi di aver ben compreso le spiegazioni circa il proprio stato di salute ed i trattamenti ricevuti ed avere strani “macchinari” intorno”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 10 Campione Infermieri: punteggio voce 8)

Il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, ha indicato *“sentire la mancanza dei propri familiari”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 11 Campione Infermieri: punteggio voce 9)

Il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, ha indicato “*avere paura del futuro e/o paura di morire*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 12 Campione Infermieri: punteggio voce 14)

Il 9,1% del campione, pari a 3 infermieri, ha indicato “*avere la sensazione di soffocare*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 13 Campione Infermieri: punteggio voce 25)

Il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, ha indicato “*avere sete*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 14 Campione Infermieri: punteggio voce 15)

Il 6,1% del campione, pari a 2 infermieri, ha indicato “*avere paura dell'incontinenza e di sporcare il letto*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 15 Campione Infermieri: punteggio voce 19)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato “*avere letto e cuscino scomodi*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 16 Campione Infermieri: punteggio voce 1)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato “*percepire che l’infermiere è preoccupato per lo stato di salute della persona*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 17 Campione Infermieri: punteggio voce 3)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato *“trovarsi in un ambiente troppo caldo o troppo freddo”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 18 Campione Infermieri: punteggio voce 5)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato *“percepire la presenza di troppa luce anche di notte e non riuscire a dormire”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 19 Campione Infermieri: punteggio voce 12)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato “*sentire altri pazienti che si lamentano*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 20 Campione Infermieri: punteggio voce 17)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato “*non sapere dove si è, che giorno è, che ore sono e/o essere annoiato*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 21 Campione Infermieri: punteggio voce 21)

Il 3% del campione, pari ad 1 infermiere, ha indicato “*essere svegliati durante il sonno notturno da allarmi vari e telefono che squilla*” come il disagio maggiore.



Grafico nr. 22 Campione Infermieri: punteggio voce 23)