

## CAPITOLO III

### *Il campione Utenti: analisi qualitativa e quantitativa dei dati rilevati*

Il campione preso in considerazione per realizzare lo studio è ben più ristretto di quello utilizzato dal Dott. Marc A. Cornock, essendo la realtà di Terapia Intensiva nella quale ho condotto l'indagine più piccola della realtà inglese.

Gli utenti intervistati sono 30; gli infermieri intervistati sono 33.

Per ottenere le tabelle di frequenza ed i grafici ho utilizzato il programma di elaborazione statistica Epi Info, versione 3.5.1., 13 agosto 2008.

Il presente capitolo è dedicato all'analisi dei risultati relativi al gruppo degli utenti.

Le domande che precedono le voci del questionario hanno reso le seguenti informazioni.

Il campione degli utenti è costituito esattamente dal 50% di donne e dal 50% di uomini (Tabella nr. 1).

Sesso	Frequency	Percent	Cum Percent
<b>F</b>	15	50,0%	50,0%
<b>M</b>	15	50,0%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 1 Campione utenti: frequenza del sesso




Grafico nr. 1 Campione utenti: sesso

L'età delle persone intervistate è compresa tra 28 anni, il più giovane e 88, il più anziano. L'età con la frequenza maggiore è 79 anni con tre casi pari al 10% del campione; seguono 56, 59, 81, 82 anni con due casi per ciascuna età, pari al 6,7% ed infine tutte le età rimanenti con un solo caso ciascuna, pari al 3,3% del campione.

<b>Età</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>28</b>	1	3,3%	3,3%
<b>38</b>	1	3,3%	6,7%
<b>47</b>	1	3,3%	10,0%
<b>48</b>	1	3,3%	13,3%
<b>49</b>	1	3,3%	16,7%
<b>51</b>	1	3,3%	20,0%
<b>55</b>	1	3,3%	23,3%
<b>56</b>	2	6,7%	30,0%
<b>59</b>	2	6,7%	36,7%
<b>61</b>	1	3,3%	40,0%
<b>62</b>	1	3,3%	43,3%
<b>64</b>	1	3,3%	46,7%
<b>66</b>	1	3,3%	50,0%
<b>67</b>	1	3,3%	53,3%
<b>71</b>	1	3,3%	56,7%
<b>75</b>	1	3,3%	60,0%
<b>77</b>	1	3,3%	63,3%
<b>79</b>	3	10,0%	73,3%
<b>81</b>	2	6,7%	80,0%
<b>82</b>	2	6,7%	86,7%
<b>83</b>	1	3,3%	90,0%
<b>85</b>	1	3,3%	93,3%
<b>87</b>	1	3,3%	96,7%
<b>88</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 2 Campione utenti: frequenza delle età

## Età degli Utenti




Grafico nr. 2 Campione utenti: età

Il 33,3% del campione ha conseguito come titolo di studio la Licenza media inferiore, il 30% il Diploma di scuola media superiore, il 26,7% la Licenza elementare ed il restante 10% Diploma universitario o Laurea.

Titolo di studio	Frequency	Percent	Cum Percent
Diploma scuola media superiore	9	30,0%	30,0%
Diploma universitario/Laurea	3	10,0%	40,0%
Licenza elementare	8	26,7%	66,7%
Licenza scuola media inferiore	10	33,3%	100,0%
Total	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 3 Campione utenti: frequenza del titolo di studio




Grafico nr. 3 Campione utenti: titolo di studio

Come si può intuire visionando la tabella nr. 2, il 40% del campione pari a 12 persone è pensionato; il 23,3%, 7 persone, è rappresentato dalle casalinghe, il 13,3%, 4 persone, è impiegato, il 10%, 3 persone, è operaio, il 6,7% , 2 persone, è disoccupato, il 3,3%, 1 persona, è artigiano ed il restante 3,3% , 1 persona, è libero professionista.

Professione	Frequency	Percent	Cum Percent
Artigiana/o	1	3,3%	3,3%
Casalinga	7	23,3%	26,7%
Disoccupato	2	6,7%	33,3%
Impiegata/o	4	13,3%	46,7%
Libera/o professionista	1	3,3%	50,0%
Operaia/o	3	10,0%	60,0%
Pensionata/o	12	40,0%	100,0%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tabella nr. 4 Campione utenti: frequenza delle attività lavorative




Grafico nr. 4 Campione utenti: attività lavorativa

Analizziamo ora i risultati di ciascuna voce del questionario, in ordine di numerazione di domanda.

#### *1. Avere letto o cuscino scomodi:*

24 persone, pari all'80% del campione, non lo hanno indicato tra le 5 voci più importanti;

3 persone, pari al 10% del campione, lo hanno invece indicato come il disagio in assoluto maggiormente avvertito, assegnando un punteggio di 1;

il restante 10% del campione è ripartito in :

1/3 che ha assegnato un punteggio di 3;

1/3 che ha assegnato un punteggio di 4;

1/3 che l'ha indicato come la quinta delle 5 voci più importanti.

<b>1) Avere letto e cuscino scomodi</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	24	80,0%	80,0%
<b>1</b>	3	10,0%	90,0%
<b>3</b>	1	3,3%	93,3%
<b>4</b>	1	3,3%	96,7%
<b>5</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 5 Campione utenti: frequenza voce 1)

*2. Essere sottoposto a frequenti misurazioni dei parametri vitali e/o ad esami emato-fisici:*

26 persone, pari all' 86,7% del campione, non lo hanno indicato tra le 5 voci ritenute più importanti;

il restante 13,3% del campione è così ripartito:

1 persona, pari al 3,3%, ha assegnato un punteggio di 1, ritenendo il disagio espresso dalla voce come il maggiormente provato;

1 persona, pari al 3,3%, ha assegnato un punteggio di 2;

1 persona, pari al 3,3%, ha assegnato un punteggio di 3 ed

1 persona, pari al 3,3%, ha assegnato un punteggio di 5, ritenendo la voce come l'ultima delle 5 considerate principali.

<b>2) Essere sottoposto a frequenti misurazioni dei parametri vitali e/o ad esami emato-fisici</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	26	86,7%	86,7%
<b>1</b>	1	3,3%	90,0%
<b>2</b>	1	3,3%	93,3%
<b>3</b>	1	3,3%	96,7%
<b>5</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 6 Campione utenti: frequenza voce 2)

*3. Percepire che l'infermiere è preoccupato per lo stato di salute della persona:*

26 persone, pari all' 86,7% del campione, non lo hanno indicato tra le 5 voci ritenute più importanti;

2 persone, pari al 6,7%, hanno assegnato un punteggio di 2;

1 persona, pari al 3,3%, ha assegnato un punteggio di 3;

1 persona, pari al 3,3%, ha assegnato un punteggio di 4.

<b>3) Percepire che l'infermiere è preoccupato per lo stato di salute della persona</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	26	86,7%	86,7%
<b>2</b>	2	6,7%	93,3%
<b>3</b>	1	3,3%	96,7%
<b>4</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 7 Campione utenti: frequenza voce 3)



#### *4. Avere preoccupazioni relative alla sfera affettiva/sexuale:*

28 persone, pari al 93,3% del campione, non lo hanno classificato tra le 5 voci più importanti;

la restante parte del campione ha assegnato per metà un punteggio di 3 e per metà un punteggio di 4.

<b>4) Avere preoccupazioni relative alla sfera affettiva/sexuale</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	28	93,3%	93,3%
<b>3</b>	1	3,3%	96,7%
<b>4</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 8 Campione utenti: frequenza voce 4)

#### *5. Trovarsi in un ambiente troppo caldo o troppo freddo:*

29 persone, pari al 96,7% del campione, non considera questa voce come tra le 5 più importanti;

1 persona, 3,3%, le assegna invece il punteggio di 1.

<b>5) Trovarsi in un ambiente troppo caldo o troppo freddo</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	29	96,7%	96,7%
<b>1</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 9 Campione utenti: frequenza voce 5)

*6. Essere nudi e non avere privacy:*

il 53,3% del campione, pari a 16 persone, non ritiene questa voce prioritaria;

il 20% del campione, pari a 6 persone, la considera come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1;

il 13,3% del campione, pari a 4 persone, assegna un punteggio di 4;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 3;

infine il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 4.

<b>6) Essere nudi e non avere privacy</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	16	53,3%	53,3%
<b>1</b>	6	20,0%	73,3%
<b>2</b>	4	13,3%	86,7%
<b>3</b>	3	10,0%	96,7%
<b>4</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 10 Campione utenti: frequenza voce 6)

*7. Avvertire la presenza di persone che parlano intorno al letto:*

il 93,3% del campione, pari a 28 persone, non considera questa voce come appartenente alle 5 più importanti;

la restante percentuale la classifica per metà con punteggio 2 e per metà con punteggio 3.

<b>7) Avvertire la presenza di persone che parlano intorno al letto</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	28	93,3%	93,3%
<b>2</b>	1	3,3%	96,7%
<b>3</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 11 Campione utenti: frequenza voce 7)

*8. Non essere certi di aver compreso le spiegazioni circa il proprio stato di salute ed i trattamenti ricevuti ed avere strani “macchinari” intorno:*

il 90% del campione, pari a 27 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 1;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 4;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 5.

<b>8) Non essere certi di aver ben compreso le spiegazioni circa il proprio stato di salute ed i trattamenti ricevuti ed avere strani "macchinari" intorno</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	27	90,0%	90,0%
<b>1</b>	1	3,3%	93,3%
<b>4</b>	1	3,3%	96,7%
<b>5</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 12 Campione utenti: frequenza voce 8)

### *9. Sentire la mancanza dei propri familiari:*

il 73,3% del campione, pari a 22 persone, esclude la voce dalle 5 più importanti;  
il 13,3% del campione, pari a 4 persone, le assegna un punteggio di 3;  
il 6,7% del campione, pari a 2 persone, le assegna un punteggio di 2 ed il  
restante 6,7%, pari a 2 persone, la considera come la voce principale,  
assegnando un punteggio di 1.

<b>9) Sentire la mancanza dei propri familiari</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	22	73,3%	73,3%
<b>1</b>	2	6,7%	80,0%
<b>2</b>	2	6,7%	86,7%
<b>3</b>	4	13,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 13 Campione utenti: frequenza voce 9)

### *10. Sentire dolore:*

il 50% del campione, pari a 15 persone, non ritiene questa voce appartenente  
alle 5 principali;  
il 20% del campione, pari a 6 persone, considera il dolore il disagio maggiore,  
attribuendo un punteggio di 1;  
il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 2;  
il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 3;  
il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4;  
il restante 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 5.

<b>10) Sentire dolore</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	15	50,0%	50,0%
<b>1</b>	6	20,0%	70,0%
<b>2</b>	3	10,0%	80,0%
<b>3</b>	2	6,7%	86,7%
<b>4</b>	2	6,7%	93,3%
<b>5</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 14 Campione utenti: frequenza voce 10)

*11. Percepire la costante presenza di infermieri che svolgono attività intorno al proprio letto:*

il 90% del campione, pari a 27 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, la ritiene invece quella prioritaria;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 2;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 3.

<b>11) Percepire la costante presenza di infermieri che svolgono attività intorno al proprio letto</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	27	90,0%	90,0%
<b>1</b>	1	3,3%	93,3%
<b>2</b>	1	3,3%	96,7%
<b>3</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 15 Campione utenti: frequenza voce 11)

*12. Percepire la presenza di troppa luce anche di notte e non riuscire a dormire:*

il 90% del campione, pari a 27 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 2;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 3.

<b>12) Percepire la presenza di troppa luce anche di notte e non riuscire a dormire</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	27	90,0%	90,0%
<b>2</b>	2	6,7%	96,7%
<b>3</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 16 Campione utenti: frequenza voce 12)

*13. Avvertire cattivi odori intorno:*

l' 83,3% del campione, pari a 25 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 4;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 3;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, reputa la voce come prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

<b>13) Avvertire cattivi odori intorno</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	25	83,3%	83,3%
<b>1</b>	1	3,3%	86,7%
<b>3</b>	1	3,3%	90,0%
<b>4</b>	3	10,0%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 17 Campione utenti: frequenza voce 13)

*14. Avere paura del futuro e/o di morire:*

il 60% del campione, pari a 18 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 13,3% del campione, pari a 4 persone, assegna un punteggio di 3;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 2;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 5;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, reputa la voce prioritaria.

<b>14) Avere paura del futuro e/o di morire</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	18	60,0%	60,0%
<b>1</b>	1	3,3%	63,3%
<b>2</b>	3	10,0%	73,3%
<b>3</b>	4	13,3%	86,7%
<b>4</b>	2	6,7%	93,3%
<b>5</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 18 Campione utenti: frequenza voce 14)

*15. Avere sete:*

il 66,7% del campione, pari a 20 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 13,3% del campione, pari a 4 persone, reputa la voce come prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 5;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 3;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 2.

<b>15) Avere sete</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	20	66,7%	66,7%
<b>1</b>	4	13,3%	80,0%
<b>2</b>	1	3,3%	83,3%
<b>3</b>	2	6,7%	90,0%
<b>5</b>	3	10,0%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 19 Campione utenti: frequenza voce 15)

*16. Avere tubi nel naso e/o nella bocca e non essere in grado di comunicare:*

l' 83,3% del campione, pari a 25 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 13,3% del campione, pari a 4 persone, assegna un punteggio di 5;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 4.



<b>16) Avere tubi nel naso e/o nella bocca e non essere in grado di comunicare</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	25	83,3%	83,3%
<b>4</b>	1	3,3%	86,7%
<b>5</b>	4	13,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 20 Campione utenti: frequenza voce 16)

*17. Sentire altri pazienti che si lamentano:*

il 76,7% del campione, pari a 23 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 2;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4;

il restante 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 5.

<b>17) Sentire altri pazienti che si lamentano</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	23	76,7%	76,7%
<b>2</b>	3	10,0%	86,7%
<b>4</b>	2	6,7%	93,3%
<b>5</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 21 Campione utenti: frequenza voce 17)

*18. Non conoscere la durata della propria degenza in Terapia Intensiva:*

il 73,3% del campione, pari a 22 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 5;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 2;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 3;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, considera questa voce come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

<b>18) Non conoscere la durata della propria degenza in Terapia Intensiva</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	22	73,3%	73,3%
<b>1</b>	1	3,3%	76,7%
<b>2</b>	2	6,7%	83,3%
<b>3</b>	2	6,7%	90,0%
<b>5</b>	3	10,0%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 22 Campione utenti: frequenza voce 18)

*19. Avere paura dell'incontinenza e di sporcare il letto:*

il 70% del campione, pari a 21 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 3;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 5;

il restante 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna il punteggio massimo.

<b>19) Avere paura dell'incontinenza e di sporcare il letto</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	21	70,0%	70,0%
<b>1</b>	2	6,7%	76,7%
<b>3</b>	3	10,0%	86,7%
<b>4</b>	2	6,7%	93,3%
<b>5</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 23 Campione utenti: frequenza voce 19)

*20. Avvertire disagio durante le pratiche igieniche perché l'acqua è troppo fredda/calda:*

il 96,7% del campione, pari a 29 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 4.

<b>20) Avvertire disagio durante le pratiche igieniche perché l'acqua è troppo fredda/calda</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	29	96,7%	96,7%
<b>4</b>	1	3,3%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 24 Campione utenti: frequenza voce 20)

*21. Non sapere dove si è, che giorno è, che ore sono e/o essere annoiato:*

il 73,3% del campione, pari a 22 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 5;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 2;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 3;

il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 4;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, considera questa voce come quella prioritaria in assoluto, assegnando un punteggio di 1.

<b>21) Non sapere dove si è, che giorno è, che ore sono e/o essere annoiato</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	22	73,3%	73,3%
<b>1</b>	1	3,3%	76,7%
<b>2</b>	2	6,7%	83,3%
<b>3</b>	1	3,3%	86,7%
<b>4</b>	1	3,3%	90,0%
<b>5</b>	3	10,0%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 25 Campione utenti: frequenza voce 21)

*22. Avere fame:*

il 90% del campione, pari a 27 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 2.

<b>22) Avere fame</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	27	90,0%	90,0%
<b>2</b>	1	3,3%	93,3%
<b>4</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 26 Campione utenti: frequenza voce 22)

*23. Essere svegliati durante il sonno notturno da allarmi vari e telefono che squilla:*

l' 80% del campione, pari a 24 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 10% del campione, pari a 3 persone, assegna un punteggio di 2;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4;

il restante 3,3% del campione, pari ad 1 persona, assegna un punteggio di 3.

<b>23) Essere svegliati durante il sonno notturno da allarmi vari e telefono che squilla</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	24	80,0%	80,0%
<b>2</b>	3	10,0%	90,0%
<b>3</b>	1	3,3%	93,3%
<b>4</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 27 Campione utenti: frequenza voce 23)

*24. Non poter ricoprire il ruolo abituale nella famiglia e/o avere preoccupazioni lavorative e/o finanziarie:*

l' 86,7% del campione, pari a 26 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 3;

il restante 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 4.

<b>24) Non poter ricoprire il ruolo abituale nella famiglia e/o avere preoccupazioni lavorative e/o finanziarie</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	26	86,7%	86,7%
<b>3</b>	2	6,7%	93,3%
<b>4</b>	2	6,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 28 Campione utenti: frequenza voce 24)

*25. Avere la sensazione di soffocare:*

il 63,3% del campione, pari a 19 persone, non classifica la voce tra le 5 più importanti;

il 16,7% del campione, pari a 5 persone, assegna un punteggio di 5;

il 13,3% del campione, pari a 4 persone, assegna un punteggio di 4;

il restante 6,7% del campione, pari a 2 persone, assegna un punteggio di 3.

<b>25) Avere la sensazione di soffocare</b>	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Cum Percent</b>
<b>0</b>	19	63,3%	63,3%
<b>3</b>	2	6,7%	70,0%
<b>4</b>	4	13,3%	83,3%
<b>5</b>	5	16,7%	100,0%
<b>Total</b>	30	100,0%	100,0%

Tabella nr. 29 Campione utenti: frequenza voce 25)

Di seguito espongo i risultati ottenuti dall'indagine relativa agli utenti.

Il 20% del campione, pari a 6 persone, ha indicato “*essere nudi e non avere privacy*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 5 Campione Utenti: punteggio voce 6)

Il 20% del campione, pari a 6 persone, ha indicato “*sentire dolore*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 6 Campione Utenti: punteggio voce 10)

Il 13,3% del campione, pari a 4 persone, ha indicato “*avere sete*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 7 Campione Utenti: punteggio voce 15)



Il 10% del campione, pari a 3 persone, ha indicato “*avere letto e cuscino scomodi*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 8 Campione Utenti: punteggio voce 1)

Il 6,7% del campione, pari a 2 persone, ha indicato “*sentire la mancanza dei propri familiari*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 9 Campione Utenti: punteggio voce 9)

Il 6,7% del campione, pari a 2 persone, ha indicato *“avere paura dell’incontinenza e di sporcare il letto”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 10 Campione Utenti: punteggio voce 19)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato *“essere sottoposto a frequenti misurazioni dei parametri vitali e/o ad esami emato- fisici”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 11 Campione Utenti: punteggio voce 2)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato *“trovarsi in un ambiente troppo caldo o troppo freddo”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 12 Campione Utenti: punteggio voce 5)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato *“non essere certi di aver ben compreso le spiegazioni circa il proprio stato di salute ed i trattamenti ricevuti ed avere strani “macchinari” intorno”* come il disagio maggiore.




Grafico nr. 13 Campione Utenti: punteggio voce 8)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato “*percepire la costante presenza di infermieri che svolgono attività intorno al proprio letto*” come il disagio maggiore.



Grafico nr. 14 Campione Utenti: punteggio voce 11)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato “*avvertire cattivi odori intorno*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 15 Campione Utenti: punteggio voce 13)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato “*avere paura del futuro e/o paura di morire*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 16 Campione Utenti: punteggio voce 14)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato “*non conoscere la durata della propria degenza in terapia intensiva*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 17 Campione Utenti: punteggio voce 18)

Il 3,3% del campione, pari ad 1 persona, ha indicato “*non sapere dove si è, che giorno è, che ore sono e/o essere annoiato*” come il disagio maggiore.




Grafico nr. 18 Campione Utenti: punteggio voce 21)